

ИСХРАНА ЈЕЛЕНА ЛОПАТАРА

Као преживар ова врста дивљачи има сличан избор хранива као јелен и срна. Лопатар није избирљив у храњењу и сматра се поред тога великим прождрљивцем. Због тога и прави велике штете ратарским културама

Пресечна телесна маса одраслих лопатар износи око 50 кг. Њихова потреба за одржавање живота (сем периода паровења) износи:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. скробних јединица | 0,48 кг |
| 2. сварљивих протеина | 80 гр |
| 3. Са | 4 гр |
| 4. Р | 3 гр |
| 5. суве материје | 1,2 кг |
| 6. однос сварљивих протеина: SJ | 1:6 |

У време растења роговља, које је у лопатара масе у просеку 2,6 кг и расте око 130 дана, укупне дневне потребе у калцијуму износи 11,5 гр, а фосфору 8 гр. У то време се повећава потреба у енергији и сварљивим протеинима за 50% изнад потреба за одржавање живота

Дневни оброк за одржавање живота одраслих лопатара састоји се од 2-3 кг сочне хране, 0,3 кг концентрата и 0,25 кг сена лептирњача (јер ливадско сено нерадо једу). У време паровења оброк се повећава за 50% првенствено на рачун концентрованог дела. Потребне одраслих категорија ове дивљачи зависе од телесне масе и њихове производње. С обзиром да код нас има мало лопатара у слободној природи, потребно је укратко осврнути се на њихово храњење у оборима и гатерима

У оборима је неопходно хранити лопатаре у току целе године. Задовољавају оброци од сочне хране, концентрата и сена у зимском периоду. Упркос скромности лопатара у исхрани, ловачки стручњаци препоручују да се лопатарима у оборима даје и помало лисника (свеже) и гранчица поред основне хране. У гатерима храњење или прихрањивање зависи од расположиве природне хране. И у оборима и гатерима треба поставити више, удаљених једна од друге хранилица – корита, јер мужјаци редовно ометају женке и подмладак у узимању хране. Храна се полаже у оборима и гатерима (на хранилиштима) сваког дана ујутро

Лопатари се у оборима и гатерима скоро припитоме и по правилу мужјаци не постају злоћудни, па то олакшава полагање хране